

25 INDICATORI DI DOLORE NEL GATTO

Traduzione a cura di Sonia Campa



Un gruppo internazionale di ricercatori e clinici ha stilato una lista di **25 segnali** sensoriali ed emotivi da considerare come “sufficienti” indicatori di **dolore fisico nel gatto**.

Secondo i ricercatori, ogni segnale - ove non diversamente specificato - può esprimere vari livelli di intensità di dolore, da basso ad alto. Alcuni segnali, tuttavia, sono in comune con altre condizioni (fisiche e/o comportamentali) non necessariamente dolorose (es. ringhio o coda agitata).

L'elenco rappresenta una guida per migliorare la corretta interpretazione del comportamento del gatto e per intervenire repentinamente sulla sua salute consultando il veterinario al sorgere dei primi segnali di dolore, nonché per migliorare le condizioni di degenza dei gatti medicalizzati (*).

- | | |
|--|---|
| 1. Zoppia | 15. Alterazioni del peso |
| 2. Riluttanza nel saltare | 16. Leccamento di specifiche zone del corpo |
| 3. Andatura alterata | 17. Testa bassa |
| 4. Riluttanza al movimento | 18. Blefarosparmo (chiusura persistente e involontaria delle palpebre) |
| 5. Reazione alla palpazione | 19. Alterazioni nel modo di mangiare (raro con dolore lieve) |
| 6. Isolamento/Tendenza a nascondersi | 20. Evitamento di zone luminose/soleggiate (raro con dolore lieve) |
| 7. Mancata pulizia del mantello | 21. Ringhio (raro con dolore lieve) |
| 8. Riduzione del gioco | 22. Gemito (raro con dolore lieve) |
| 9. Riduzione dell'appetito | 23. Occhi chiusi (raro con dolore lieve) |
| 10. Riduzione generale delle attività | 24. Difficoltà ad urinare |
| 11. Riduzione dei contatti con le persone | 25. Coda nervosamente agitata |
| 12. Malumore | |
| 13. Combiamento di temperamento | |
| 14. Postura rannicchiata | |

(*) I. Merola, D. S. Mills, *Behavioural Signs of Pain in Cats: An Expert Consensus*, PLoS ONE 11(2): e0150040. doi:10.1371/journal.pone.0150040